

INFORMACIJE O PROIZVODU

NOSESTAT otopina

Pomoćno medicinsko sredstvo za pčele

Sastav proizvoda:

- Bočica pod brojem 1 sadržava:
jod (4 g) adjuvansi i pomoćne tvari (ad 80 ml).
- Bočica pod brojem 2 sadržava:
mravlja kiselina (5 g) adjuvansi i pomoćne tvari (ad 20 ml).

Ciljne vrste životinja:

Pčela medarica (*Apis mellifera* L.)

Kratak opis područja primjene proizvoda, uputa za upotrebu, indikacije:

NOSESTAT otopina se preporučuje kao pomoćna terapija protiv nozemoze koju su prouzrokovale *Nosema apis* i *Nosema ceranae*. Svoj učinak zahvaljuje povoljnim osobinama joda i mravlje kiseline. Sadržaj mravlje kiseline u proizvodu pomaže kao pomoćna terapija protiv varooze koju je prouzrokovala grinja varroa (*Varroa destructor*). Proizvod sadrži stabilizator i začine tako da ga pčele rado jedu. NOSESTAT otopina se koristi u šećernoj pogači ili šećernom sirupu, u kojima se dobro otapa.

Preporučeno doba terapije: na jesen i proljeće.

Doziranje i način primjene:

Oralna primjena, prihraniti 1:1 (50%-otnom) šećernim sirupom i pogačom. Sadržaj bočica se treba dobro promućkati, zatim sadržaj bočice broj 2 prelići u bočicu broj 1. Tako dobivenu otopinu trebamo promiješati. U jednu litru šećernog sirupa ili u jedan kilogram pogače iz gornje otopine dodajmo 5 ml.

Pripremljena otopina i već umiješana u pogaču i šećerni sirup u roku od 3 dana se treba potrošiti.

Tretman sa šećernim sirupom:

Sa šećerom tri puta se treba tretirati pčele, i između pojedinačnih tretmana držati tri dana pauzu (znači u 1., 4. i 7. danu). Po tretmanu treba se prihraniti 500-800 ml. Poslije jednotjedne pauze treba se ponoviti tretman prema gore navedenom.

Tretman sa šećernom pogačom:

Kod tretmana davanja pogače 200-300 g se daje zajednici. Ako su pčele pojele NOSESTAT otopinsku pogaču, tretman ponovimo još jedanput.

Proizvod se ne može upotrijebiti u umiješanu stočnu hranu!

Kontraindikacije:

Nemojmo primjenjivati zajedno s drugim proizvodom za tretman ili prevenciju.

Primjenu NOSESTAT otopine najkasnije trebamo završiti 7. dan prije početka paše.

Nuspojave:

Nuspojave nisu poznate.

Upozorenje:

Tokom rada s NOSESTAT otopinom preporuča se korištenje polietilen ili lateks rukavica i zaštitnog odijela, s time se može izbjeći iritacija kože i obojanje, te mrlje na odjeći. Primjena NOSESTAT otopine ne zamjenjuje ciljni tretman protiv varooze.

Sadržaj opasne tvari u bočici broj 1 : jod



OPREZ

H- rečenice koje nas upozoravaju na opasnosti/ rizik otopine:

- Štetan prilikom dodira s kožom.
- Štetan prilikom udisanja.
- Jako toksičan za organizme vodenih ekosustava.

P – rečenice koje nas upozoravaju na sigurnu primjenu opasne mješavine:

- Isključivo se primjenjuje na slobodnom ili dobro provjetravajućem mjestu.
- Treba se izbjegavati direktno izlivanje u okoliš.
- Ako vam pozli obratite se CENTRU ZA TOKSOLOGIJU ili liječniku.
- AKO DOĐE U KONTAKT S KOŽOM: oprati s većom količinom vode i sapunom.
- U SLUČAJU UDISANJA: Osobu se treba izvesti van na zrak i položiti je tako da može dobro disati.
- Smjestiti Sadržaj/ambalažu kao otpad: postupa se u skladu sa mjesnim Zakonom o otpadu.

Sadržaj opasne tvari u bočici broj 2: mravlja kiselina



OPASNOST

H- rečenice koje nas upozoravaju na opasnosti/ rizik otopine:

- Uzrokuje ozbiljne opekline i oštećenje oka

P – rečenice koje nas upozoravaju na sigurnu primjenu opasne mješavine:

- Držati od pogleda i dohvata djece.
- U SLUČAJU UDISANJA: : Osobu se treba izvesti van na zrak i položiti je tako da može dobro disati.
- U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Isprati oprezno više minuta s vodom. U dotičnom slučaju izvaditi kontakt leće, ako se može lako riješiti. I zatim nastaviti ispranje vodom.
- U SLUČAJU GUTANJA: isprati usta. ZABRANJENO je osobu natjerati da povraća.
- AKO DOĐE U KONTAKT S KOŽOM (ili kosom): svu onečišćenu odjeću odmah odstraniti /skinuti. Kožu isprati vodom/ istuširati se.
- Smjestiti Sadržaj/ambalažu kao otpad: postupa se u skladu sa mjesnim Zakonom o otpadu.

Rok valjanosti:

Označenje na opremi u originalnoj ambalaži 5 godina.

Poslije otvaranja rok valjanosti 20 dana.

Posebne mjere predostrožnosti za čuvanje

Čuvati u originalnom pakovanju, na suhomi od direktnog sunčevog svjetla zaštićenom mjestu, na temperaturi između 5- 30 °C.

Pakovanje:

Papirnata kutija sadrži:

Bočica broj 1.: bočica koja sadrži 80 ml otopine ili PE bočica.

Bočica broj 2.:PE bočica sadrži 20 ml otopine.

Jednokratna šprica, sa nastavkom/produžkom.

Samo za primjenu na životinjama!

Posebne mjere opreza prilikom odlaganja neupotrebljivog proizvoda ili otpadnih materijala:

Smjestiti Sadržaj/ambalažu kao otpad: postupa se u skladu sa mjesnim Zakonom o otpadu.

Proizvođač:

Primavet-Sofia Ltd, 211A, Slivnitsa blvd. 1202 Sofija, Bugarska

Distributer:

EURO-VET Zöldsziget Kft. 7500 Nagyatád, Petőfi Sándor u. 24. Tel.: +36-82/454-413; Fax.: +36-82/553-180; zoldsziget.euro-vet.hu; zoldsziget@euro-vet.hu

Registracijski broj proizvoda:

472/1/2012 NÉBIH ÁTI

Rok valjanosti:

Broj proizvodne serije: