

Produktinformationen

Bezeichnung der Produktion

Nosestat

Paramedizin Produktion für Honigbienen

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile

- Das Inhalt der Nr. 1 Flasche:
Jod (4 g) mit andere Bestandteile (ad 80 ml).
- Das Inhalt der Nr. 2 Flasche:
Ameisensäure (5 g) mit andere Bestandteile (ad 20 ml).

Zieltierart(en)

Honigbiene (*Apis mellifera* L.)

Anwendungsgebiete

Zur zusätzlichen Behandlung der Nosematosis bei der Nosema apis oder der Nosema ceranae. Das Produkt hat guten Effekt weil es Jod und Ameisensäure einhältet. Weil das Produkt Ameisensäure einhältet, deswegen es ist zusätzlich benutzbar gegen Varroose beim Varroa destructor. Das Produkt also einhältet Stabilisieren und Aromen, so die Bienen essen gern. Nosestat kann man benutzen mit Zuckerkuchen oder Zuckersirup, und es lösen sehr gut in diesem Materialien auf.

Behandlung Zeit ist: Fall und Frühling.

Dosierungen für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Sie müssen das Produkt in 1:1 Ratio mit Zuckersirup oder Zuckerkuchen mischen. Sie sollen die Flaschen gut schütteln, und die Inhalt von der Nr.2 Flasche in der Nr. 1 Flasche eingießen. Die Lösung sollen Sie gut schütteln.

Sie sollen 5 ml Lösung geben zum 1 Liter Zuckersirup oder 1 kg Zuckerkuchen.

Die Lösung das ist gemischt mit der Zuckersirup oder die Zuckerkuchen darf man für 3 Tagen benutzen.

Anwendung mit Zuckersirup:

Sie müssen Die Bienen mit der Zuckersirup dreimal anwenden, aber 3 Tagen muss zwischen die Behandlungen sein (Sie müssen das Produkt anwenden an dem erste, vierte und siebte Tage). Am jeden Behandlung sollen Sie 500-800 ml als Fütterung geben. Nach eine Woche können Sie die Behandlung wiederholen.

Anwendung mit Zuckerkuchen:

Wenn Sie die Bienenvölker mit Zuckerkuchen behandeln möchte, dann sollen sie 200-300 g geben für die Völker. Wenn die Bienenvölker das Produkt gegessen hat, dann können Sie die Behandlung noch einmal wiedermachen.

Das Produkt ist nicht benutzbar für die Herstellung von einem Fütterung Mischen!

Wenn sie die Überdosierung vermieden möchte, sollen Sie die Einwegspritze benutzen.

Gegenanzeigen

Sie sollen das Produkt nicht gleichzeitig benutzen mit anderen Produkten für die Behandlung oder Vermeiden.

Die Benutzung von Nosestat müssen Sie vor 7 Tagen bevor die Tracht beenden.

Nebenwirkungen

Keine.

Verfalldatum


Die Produkte ist verwendbar nach der Herstellung vor 2 Jahren.

Wenn das Produkt ist fertig für Benutzung dann es ist verwendbar vor 20 Tagen.

Besondere Warnhinweise

Während der Benutzung sollen Sie Polyethylene oder Latex Schutzhandschuhe, und Schutzkleidung tragen, so die Hautirritation und die Verfärbung von der Haut und der Kleidung kann man vermeiden. Die Benutzung von Nosestat ersetzt nicht die Anwendung von Varroose.

Inhalt von Gefahrstoff in der Nr. 1 Flasche: Jod



ACHTUNG!


H-Satze, das beziehen die Gefahren und die Risiken:

- Hautkontakt ist schädlich.
- Es ist schädlich zu einatmen.
- Es ist sehr schädlich für die Wasserleben.

P-Satze, das beziehen die ungefährliche Benutzung:

- Man darf das Produkt nur im Außen oder in einem gut ventilierten Platz benutzen.
- Sie sollen die Verschüttungen von dem Produkt zum Außen vermieden.
- Wenn Sie Krank gefühlt, dann suchen die Zentrum für Toxikologie oder einen Arzt auf.
- Beim Hautkontakt: waschen Sie mit viele Seife und Wasser.
- Beim Einatmung: nehmen Sie die Person aus frischer Luft, und setzen in einem ruhige Körperposition, so das Atmen wird leicht sein für die Person.
- Die Platzierung von das Inhalt/die Flasche als Abfall: nach nationalen Vorschriften.

Inhalt von Gefahrstoff in der Nr. 2 Flasche: Ameisensäure



GEFAHR!

H-Satze, das beziehen die Gefahren und die Risiken:

- Das Produkt kann massiv Verbrennungen und Augenschäden verursachen.

P-Satze, das beziehen die ungefährliche Benutzung:

- Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

- Beim Einatmung: nehmen Sie die Person aus frischer Luft, und setzen in einem ruhige Körperposition, so das Atmen wird leicht sein für die Person.
- Beim Augenkontakt: spülen Sie die Augen gut für einige Minuten. Wenn es nötig ist und Sie können das leicht machen, dann sollen Sie die Kontaktlinse aufnehmen. Dann sollen sie das Waschen weitermachen.
- Beim Schluck: Sie müssen das Maul gut waschen. Sie dürfen nicht übergeben.
- Beim Hautkontakt: Sie sollen alle Kleidung ausziehen/entkleiden. Dann sollen Sie die Haut gut waschen/baden.
- Die Platzierung von das Inhalt/die Flasche als Abfall: nach nationalen Vorschriften.

Besondere Lagerungshinweise

Zwischen 5-30°C, in der Originalpackung, in trockene und gut Platz lagern und nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Die Packung

Das Karton enthält:

Nr.1 Flasche: Glass oder PE Flasche enthalten 80 ml Lösung.

Nr.2 Flasche: PE Flasche enthält 20 ml Lösung.

Eine einmal Einwegspritze, mit einem Verlängerungskabel.

Nur für die Behandlung die Tiere!

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Hersteller: Primavet-Sofia Ltd., 211A, Slivnitsa blvd., 1202, Sofia, Bulgarien

Zulassungsinhaber: EURO-VET Zöldsziget Kft. 7500 Nagyatád, Petőfi Sándor u. 24., Tel.: +36 82 454 431, Fax: +36 82 553 180, zoldsziget.euro-vet.hu zoldsziget@euro-vet.hu

Zulassungsnummer für das Inverkehrbringen: 472/1/2012 NÉBIH ÁTI